

第19回日本乳癌学会関東地方会

教育セミナー（治療編）
HER2陰性乳癌に対する周術期薬物療法

がん研究会 有明病院
乳腺センター 乳腺内科
原文堅

日時：2023年12月2日（土） 9:30-11:00

症例 (1)

- 75歳女性、閉経後、ECOG-PS : 1
- 既往歴 : 高血圧、慢性腎臓病 (Ccr 55 ml/min)
- 左乳癌の診断 cT1cN0M0 cStage I

- 左乳房切除術 + センチネルリンパ節生検施行
- 術中センチネルリンパ節 (2/4, いずれも1.5mm陽性)

- 術後病理診断 : 浸潤性乳管癌、硬癌、25 x 18mm、pN1(2/4), HGⅢ, NG3, ly1, v0, ER TS8=PS5+IS3, PgR TS4=PS2+IS2, HER2 2+, DISH -, Ki-67 25%
- Oncotype DX : RS16

Q1 治療法選択のためにどのようなことを考慮する必要があるか？

Q2 最適な術後薬物療法は何か？

それぞれ、その思考過程も示すこと

症例 (2)

- 34歳女性、閉経前、ECOG-PS : 0
- 既往歴 : なし
- 既婚、無職、夫、男児3歳、拳児希望あり
- 左乳癌の診断 cT1cN0M0 cStage I

- 左乳温存術 + センチネルリンパ節生検施行
- 術中センチネルリンパ節 陰性

- 術後病理診断 : 浸潤性乳管癌、硬癌、15 x 12mm、pN0, HG II, NG2, ly0, v0, ER TS8=PS5+IS3, PgR TS4=PS2+IS2, HER2 1+, Ki-67 35%
- Oncotype DX: RS 21

Q1 治療法選択のためにどのようなことを考慮する必要があるか？

Q2 最適な術後薬物療法は何か？

それぞれ、その思考過程も示すこと